

Cada madre Cada bebé **CADA VEZ**

VACUNAS CONTRA EL RSV

QUÉ ESPERAR DEL RSV EN LOS MUY JÓVENES

Los síntomas del RSV pueden incluir:

- ▶ Irritabilidad
- ▶ Menos actividad
- ▶ Comer y beber menos
- ▶ Pausas en la respiración durante más de 10 segundos
- ▶ Bronquiolitis (inflamación de las vías respiratorias en los pulmones)
- ▶ Neumonía (infección de los pulmones)

Los bebés menores de 6 meses pueden necesitar apoyo adicional que puede incluir:

- ▶ Oxígeno
- ▶ Líquidos intravenosos
- ▶ Ventilación mecánica (una máquina que ayuda a respirar)

PROTEJA LO MÁS IMPORTANTE

Cuando se administra la vacuna contra el RSV entre las 32 y las 36 semanas de gestación, la mujer embarazada transmite anticuerpos protectores a su hijo por nacer, lo que proporciona protección hasta los 6 meses de edad.

Hable con su proveedor para saber si debe recibir la vacuna contra el RSV durante el embarazo.

Si **no** puede recibir la vacuna contra el RSV durante el embarazo, hable con el médico de su bebé sobre la inmunización contra el RSV para su recién nacido.

Se **recomienda** la vacunación contra el RSV para todos los bebés **menores de 8 meses** nacidos de madres que **no** recibieron la vacunación materna contra el RSV durante el embarazo.

La vacuna contra el RSV **debe** administrarse a los bebés poco antes de la temporada del RSV o dentro de una semana después del nacimiento si nacen entre octubre y marzo.

También se **recomienda** una inmunización contra el RSV poco antes de la **segunda temporada de RSV** del niño para un pequeño grupo de niños de 8 a 19 meses de edad que tienen un mayor riesgo de contraer el RSV grave.

LO QUE LOS HABITANTES DE KENTUCKY TIENEN QUE DECIR SOBRE LA VACUNA CONTRA EL RSV

“Si me hubieran ofrecido la vacuna durante el embarazo, la habría tomado con gusto para tener protección adicional para mi bebé hasta que ella pudiera recibirla.

-Brandis
Mamá de Kentucky,
condado de Rowan

“El embarazo puede ser un momento emocionante, pero a la vez estresante. Dedicas mucha atención y esfuerzo a todo lo que haces y evalúas si es lo mejor para tu bebé. Estaba emocionada de poder vacunarme contra el RSV al final de mi embarazo este otoño. Haría lo que fuera para protegerme y proteger a mis hijos, y eso incluye combatir enfermedades comunes como el RSV, que pueden ser mortales para los bebés.

- Catherine
Mamá de Kentucky,
condado de Jefferson

“Sabendo que ahora puedo recibir una vacuna que me protege a mí y a mi pequeño, y que significa una inyección menos para mi bebé en el futuro, no hay dudas.

- Taidem
Futura mamá de Kentucky



Kentucky Public Health
Prevent. Promote. Protect.

LO QUE NECESITA SABER SOBRE EL RSV

El virus sincitial respiratorio (RSV, por sus siglas en inglés) puede ser peligroso para los bebés y algunos niños pequeños.

Casi todos los niños contraerán el RSV antes de los 2 años. Los **menores de 6 meses** tienen **mayor** riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

El RSV se propaga cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de usted o tiene contacto directo, como besar o tocar la cara de su bebé antes de lavarse las manos.



¿SABÍA QUE?

El RSV es la **principal** causa de hospitalización infantil en los EE.UU., con un estimado de 58,000 a 80,000 niños menores de 5 años hospitalizados cada año

COSAS A CONSIDERAR:

- Actualmente, la vacuna contra el RSV no es anual. Solo se recomienda una dosis única.
- Si una mujer embarazada recibió una vacuna materna contra el RSV durante el embarazo, **no** debe recibir la vacuna durante ningún embarazo futuro.

KIT DE HERRAMIENTAS PARA CADA MADRE, CADA BEBÉ, CADA VEZ



Obtenga más información sobre los beneficios de las vacunas durante el embarazo accediendo al kit de herramientas *Cada madre, cada bebé, cada vez*.

Escanee el código QR o visite:

<https://www.chfs.ky.gov/agencies/dph/dehp/imm/EveryMother,EveryBaby,EVERYTIMEParentToolkit.pdf>



REFERENCIAS

- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 2024. Vacunas para proteger a los bebés <https://www.cdc.gov/rsv/vaccines/protect-infants.html>
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 2024. RSV en bebés y niños pequeños <https://www.cdc.gov/rsv/infants-young-children/index.html>



Kentucky Public Health
Prevent. Promote. Protect.

Departamento para la Salud
Pública de Kentucky
275 E Main St,
Frankfort, KY 40601
Teléfono: (502) 564-3970